

Nome comune: Canapiglia

Nome scientifico: *Anas strepera*

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Classe: Uccelli



(A cura di: Gaetano Bellia)

Nei mesi invernali, alla foce del fiume Salso, è possibile incontrare, saltuariamente, la **Canapiglia**, un'anatra di superficie timida e riservata e dalla colorazione del piumaggio poco vistoso, che ogni tanto fa capolino dalla vegetazione delle rive del fiume per nutrirsi capovolgendosi sott'acqua; sul terreno si muove con agilità e raramente la si osserva in mare, dove si posa solo in migrazione; è una specie gregaria tranne nel periodo della riproduzione; i siti di nidificazione sono localizzati nell'Europa centrale e orientale e anche in alcune aree della Francia e della Spagna; sverna nel bacino del Mediterraneo, compresa l'Italia, e lungo il Nilo.

Ha un corpo grande e slanciato (45-56 cm., 700-900 g., il maschio, 650-850 g., la femmina); il maschio è grigio e bruno chiaro con l'estremità posteriore nera, ha il becco grigio scuro e mostra una macchia bianca nello specchio alare sia in volo sia da fermo; la femmina è bruna macchiettata di nero, ha il becco bruno scuro con i lati gialli e anch'essa mostra la macchia bianca sulle ali, ma non è sempre visibile; in entrambi il ventre ed il sottocoda sono bianchi, gli occhi bruni e le zampe giallo arancio.

Il richiamo del maschio è una serie profonda di fischi e gracchiamenti, mentre la femmina schiamazza emettendo dei suoni che si addolciscono progressivamente.

Vive in un'ampia varietà di habitat d'acqua dolce poco profondi e ricchi di vegetazione palustre, compresi i prati abbondantemente inondati e i grandi fiumi dove la corrente è molto lenta; frequenta anche gli specchi d'acqua costieri debolmente salmastri.

Il nido viene costruito dalla femmina a terra tra la fitta vegetazione e vicino all'acqua e viene imbottito con foglie, erba e piumino; vengono deposte 8-12 uova, di colore crema, covate dalla sola femmina; i piccoli nascono dopo 24-26 giorni; la canapiglia nidifica una sola volta all'anno.

Si nutre soprattutto di piante d'acqua dolce, semi, granaglie; fanno parte della sua dieta anche insetti, molluschi, crostacei, vermi, girini e piccoli pesci.