



Nome comune: Cavaliere d'Italia

Nome scientifico: *Himantopus himantopus*

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Recurvirostridi

Classe: Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

Durante i mesi primaverili e fin sul finire dell'estate, periodo delle migrazioni, la foce del fiume Salso è frequentata dal **Cavaliere d'Italia**; specie socievole, in agosto sopraggiunge in gruppi nei quali sono presenti anche esemplari giovani nati durante l'estate; i nuclei familiari tendono a raggrupparsi sia quando riposano sulle rive del fiume sia quando sono alla ricerca di cibo, camminando nell'acqua bassa, con passi lunghi, leggeri e agili, e scandagliando il fondo e la superficie con il lungo becco; si riproduce nelle zone umide di quasi tutta l'Italia (per importanza la popolazione italiana, localizzata soprattutto in Emilia Romagna e Toscana, è seconda in Europa dopo quella spagnola); le popolazioni europee svernano, soprattutto a sud del Sahara, ma anche nella parte meridionale della penisola iberica, in Sardegna e nel Maghreb occidentale; la popolazione italiana sverna principalmente nel delta interno del fiume Niger.

Limicolo molto elegante e dal corpo di media taglia (34-40 cm., 140-280 g.), è caratterizzato da un collo lungo, da un becco sottile, diritto e aguzzo e da zampe lunghe e snelle, che sporgono molto dalla coda quando è in volo; ha un piumaggio contrastato di nero, dorso e ali, e di bianco, il resto; il becco è nero, gli occhi sono rossi e le zampe di colore rosso corallo; il maschio d'inverno può avere la calotta bianca, generalmente è macchiata di grigio e d'estate si colora di nero fin sulla nuca.

La voce è un penetrante e sonoro "kuip" o "kik" ripetuto spesso e rapidamente.

Vive nelle paludi umide, nelle lagune salmastre, nelle saline, nei laghi e nei fiumi con acque lente e poco profonde.

Nidifica in colonie fino ad un centinaio di coppie e costruisce il nido, una coppa formata da rametti e steli di cannuce, anche alta e a forma di tronco di cono, posata sopra i ciuffi d'erba palustre o direttamente nell'acqua bassa, oppure in una buchetta sui banchi di fango asciutto, sempre in vicinanza dell'acqua; vengono deposte solitamente 4 uova, di colore bruno chiaro con macchie scure, covate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 22-26 giorni; questa specie nidifica una sola volta all'anno e si riproduce all'età di due anni.

La sua alimentazione è costituita da piccoli invertebrati acquatici, soprattutto insetti e loro larve e molluschi; sul terreno si nutre anche di ragni ed piccoli insetti.