Osservatorio avifaunistico alla foce del fiume Salso (Imera Meridionale)

Nome comune: Codone

Nome scientifico: Anas acuta

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Classe: Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

www.focesalso.it

Alla foce del fiume Salso, a conclusione della stagione invernale, si è avuto modo di osservare, in numero esiguo ed occasionalmente, il **codone** (*Anas acuta*) mentre nuota in mare oppure si riposa sui banchi di sabbia formati dalla risacca delle onde; anatra timida e riservata, non si lascia avvicinare e se disturbata spicca il volo velocemente; si nutre in acque basse capovolgendosi e bilanciandosi con le zampe per afferrare il cibo con il becco; di abitudini gregarie, spesso lo si osserva in branchi numerosi anche insieme ad altre anatre; il suo areale europeo di riproduzione si trova nella tundra artica; i siti di svernamento sono localizzati nell'Europa centrale e occidentale, nel bacino del mediterraneo ed in Africa settentrionale; in Italia nidifica raramente ed è possibile osservarlo durante la migrazione oppure in inverno presso le foci dei fiumi e le lagune dell'Adriatico settentrionale.

E' un'anatra di superficie con il corpo slanciato ed elegante e di dimensioni medio grandi, il maschio (66 cm., 750-1050 g.) possiede un collo lungo e una coda molto lunga ed appuntita; la testa è di colore marrone, all'altezza della nuca si diparte una banda bianca che si collega al petto, anch'esso bianco, le parti laterali del corpo sono attraversati da una fitta striatura bianca e nera, il ventre è chiaro ed il sottocoda nero con una chiazza di colore crema; la femmina (56 cm., 600-850 g.), difficile da riconoscere, mostra una coda appuntita ma meno appariscente di quella del maschio, ha una colorazione bruna con il ventre chiaro e presenta un anello chiaro intorno all'occhio; entrambi hanno il becco nero e grigio e le zampe di colore grigio-verde; il maschio quando è in volo mostra sulle ali una banda alare verde scura con riflessi bronzati, mentre nella femmina la banda alare, non molto evidente, è di colore bruno-nero-bluastra.

Di solito è silenzioso; il richiamo del maschio è costituito da un fischio tenue, mentre la femmina emette dei brontolii.

Quest'anatra durante la stagione estiva frequenta laghi e paludi con una buona copertura vegetale; in inverno è diffuso soprattutto lungo le zone costiere e, in piccoli gruppi, anche nell'entroterra.

Nidifica in colonie non molto fitte sugl'isolotti e le dune sabbiose costiere; il nido, ben nascosto tra i cespugli, viene costruito al suolo dalla femmina che provvede a foderarlo, oltre che con vegetali, anche con il piumino che si strappa dal corpo; nel nido vengono deposte 7-9 uova con una colorazione che va dal crema al verdastro; i piccoli nascono dopo 22-24 giorni; il codone si riproduce una sola volta all'anno.

Si nutre di vegetali, compresi i semi; fanno parte della sua dieta anche piccoli pesci, vermi, crostacei ed altri invertebrati acquatici.