



Nome comune: Cormorano

Nome scientifico: *Phalacrocorax carbo*

Ordine: Pellicaniformi

Famiglia: Falacrocoracidi

Classe: Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

www.focesalso.it

Il **Cormorano** si presenta alla foce del fiume Salso a settembre, di ritorno dai siti di nidificazione del nord e dell'est dell'Europa, e vi sosta per tutto l'inverno fino a maggio; questi uccelli, numerosi, si possono osservare fermi sui piloni di cemento, posti al centro del letto del fiume, utilizzati come posatoi per riposarsi ed asciugare le ali dopo le battute di caccia e per trascorrervi le ore notturne; si possono osservare anche in gruppetti formati da 6-8 esemplari mentre cacciano i pesci immergendosi sotto la superficie dell'acqua oppure mentre sorvolano veloci il fiume a pelo d'acqua per spostarsi a cacciare il pesce in mare, a ridosso della costa; è un uccello che nuota molto bene e riesce a raggiungere abilmente una certa profondità, ma in acqua vi rimane solo il tempo necessario per pescare perché non possiede un piumaggio impermeabile e una lunga permanenza in acqua, inzuppando le piume, rischierebbe di farlo annegare; piuttosto impacciato nel decollare dall'acqua, è tuttavia un volatore abbastanza provetto.

Ha una struttura corporea allungata (90-92 cm., 2000-2500 g.), un collo lungo ed un becco forte, lungo e con la punta uncinata per trattenere le prede più scivolose; la sua colorazione è nera con riflessi verdi; d'estate si distingue per le chiazze bianche alla gola ed al collo ed una macchia bianca sulle cosce, mentre d'inverno presenta una caratteristica macchia gialla alla base del becco; i giovani hanno una colorazione brunastra con il ventre bianco.

Di abitudini generalmente silenziose, fa udire la sua voce rauca emettendo un gracchio gutturale durante la stagione riproduttiva.

Mentre d'inverno preferisce sostare in acque interne, lungo le coste e le foci dei fiumi, d'estate si sposta, per la nidificazione, sulle coste rocciose o nelle zone umide con alberi alti.

Per la riproduzione questi uccelli si riuniscono in colonie numerose (massimo 2000 coppie); nel nido, costruito con un ammasso di alghe e rametti, vengono deposte 3-4 uova di colore blu chiaro, ricoperte di uno strato gessoso bianco, che vengono covate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 24-31 giorni; questa specie nidifica una sola volta all'anno e la prima riproduzione avviene a 4-5 anni.

Il cibo è costituito soprattutto da pesce che, in genere, non viene inghiottito sott'acqua, ma riportato in superficie e qui riafferrato ripetutamente con il becco prima di essere ingerito; fanno parte del suo menù anche crostacei, soprattutto granchi, e vegetali.