



Nome comune: Folaga

Nome scientifico: *Fulica atra*

Ordine: Gruiformi

Famiglia: Rallidi

Classe: Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

Oltre alla gallinella d'acqua, l'altro rallide, abbastanza numeroso in inverno, osservato alla foce del fiume Salso da agosto ai primi di aprile, è la **Folaga**, una specie gregaria, chiassosa e litigiosa, che batte in lungo ed in largo il fiume per nutrirsi della vegetazione acquatica; spesso la si vede risalire, in gruppo, le rive del fiume per "pascolare" fin sul terreno; sempre in costante allerta, per maggiore sicurezza tende a riunirsi in gruppo anche al centro del letto del fiume; corre e cammina con facilità tra la vegetazione palustre; quando nuota oscilla continuamente la testa; è una specie assai frequente in Europa (tranne nelle regioni settentrionali), compresa l'Italia; le popolazioni europee più settentrionali migrano nei siti di svernamento dei paesi del bacino del Mediterraneo, della valle del Nilo ed in Etiopia.

Specie acquatica di dimensioni piuttosto massicce (37-40 cm., il maschio, 650-900 g., la femmina, 570-800 g.) con un corpo rotondo, ha le zampe molto lunghe e provviste di lunghe dita che presentano, da entrambi i lati, dei lembi membranosi; ha un piumaggio color nero grigiastro, più intenso sulla testa e sul collo, il becco e la placca frontale che lo sormonta sono bianchi, gli occhi rossi e le zampe verdastre.

La voce è un breve e penetrante "kiuk" ed emette anche dei richiami a due sillabe, "kt-kauk".

In estate preferisce vivere nei laghi e nei fiumi con le sponde ricche di vegetazione; in inverno questa specie si riunisce in grandi stormi nelle lagune salmastre e nelle foci dei fiumi con acque poco profonde.

Durante la stagione riproduttiva la coppia diventa aggressiva e territoriale; è il maschio che abbozza la costruzione del nido, una coppa di vegetali acquatici secchi poggiata su una piattaforma di vegetali galleggianti negli acquitrini bassi e fangosi circondati dal canneto, che viene completato dalla femmina; vengono deposte 6-10 uova, di colore marrone chiaro con una fitta punteggiatura scura, incubate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 21-25 giorni; la folaga effettua una deposizione all'anno, raramente due.

Il suo cibo è costituito soprattutto da piante acquatiche che strappa sott'acqua, tuffandosi anche fino a due metri di profondità, poi le porta velocemente in superficie e se ne nutre; fanno parte della sua dieta anche insetti, molluschi, vermi, piccoli pesci e rane.