



Nome comune: Fratino

Nome scientifico: *Charadrius alexandrinus*

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Caradridi

Classe: Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

www.focesalso.it

Un caradrice che si è visto tutto l'anno è stato il **Fratino**, abbastanza numeroso nei mesi estivi, quando questa specie si è riprodotta; era da decenni che non veniva segnalata la nidificazione di quest'uccello alla foce del fiume Salso; lo si può osservare mentre corre, muovendosi a scatti, tra i banchi di sabbia del fiume e lungo la spiaggia, per afferrare gli invertebrati di cui si nutre; quando d'estate il livello dell'acqua del fiume si è abbassata, mettendo allo scoperto le rive fangose, queste sono state prese d'assalto da numerosi esemplari; i siti di nidificazione sono situati in tutti i paesi europei, fino alla Scandinavia meridionale, ed in quelli dell'Africa settentrionale; sverna nelle zone umide costiere dell'Atlantico, a sud del canale della Manica, nel bacino del Mediterraneo e lungo le coste e nei laghi salati interni dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente; in Italia nidifica soprattutto nelle zone umide costiere dell'Adriatico settentrionale ed in Sardegna.

Limicolo di dimensioni piccole (15-17 cm., 32-69 g.), ha un corpo compatto con becco e zampe corti; presenta un piumaggio marrone chiaro con la faccia ed il ventre bianchi, il becco e le zampe sono neri e quando vola mostra una barra alare bianca poco distinta; il maschio ha la parte superiore del capo e la nuca di colore bruno, un disegno nero sulla fronte ed una fascia nera interrotta sul collo.

Il suo richiamo è un acuto "pit" o "huit".

E' una specie che vive soprattutto lungo le coste e nelle lagune; raramente all'interno lungo i fiumi.

Nidifica in una buchetta lungo le coste sabbiose; non nidifica in colonie ma i nidi sono sparsi ad una certa distanza l'uno dall'altro; nel nido, scarsamente rivestito con materiale vegetale, vengono deposte 3 uova, di colore fulviccio con piccole macchie e striature nere, incubate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 24-27 giorni; il fratino nidifica 1-2 volte all'anno; se un predatore si avvicina al nido gli adulti si fingono feriti per distoglierne l'attenzione dalle uova o dalla prole.

La sua dieta è costituita da crostacei, vermi, molluschi ed insetti.