



Nome comune: **Gabbianello**

Nome scientifico: **Larus minutus**

Ordine: **Caradriformi**

Famiglia: **Laridi**

Classe: **Uccelli**

(A cura di: Gaetano Bellia)

Un gabbiano che è possibile osservare alla foce del fiume Salso, in numero ridotto e raramente, durante i mesi primaverili, è il **gabbianello** (*Larus minutus*); lo si può vedere mentre si riposa, accovacciato sulla sabbia, lungo le rive del fiume, in prossimità della spiaggia, oppure mentre sorvola a bassa quota la foce, tuffandosi in acqua come una sterna per catturare qualche piccolo pesce; questa specie è diffusa nell'Europa nord-orientale e migra nell'area mediterranea; in Italia è di passo e svernante, occasionalmente può trascorrervi l'estate lungo le coste marine e nelle zone umide.

Laride molto piccolo, rispetto agli altri gabbiani si riconosce per la taglia ridotta (28 cm., 90-150 g.), presenta la superficie superiore delle ali completamente di colore grigio chiaro, le zampe sono rosse e quando è in volo mostra la superficie inferiore delle ali di colore grigio scuro, il groppone bianco e la coda di forma quadrata; in inverno il becco è nero e la testa chiara con la parte superiore grigiasta e con una macchia scura dietro l'occhio, mentre in estate, durante la stagione riproduttiva, la testa diventa tutta nera ed il becco di colore rosso scuro; i giovani hanno le zampe ed il becco di colore nero e quando sono in volo mostrano il dorso bruno e una caratteristica striscia nera a zigzag sulle ali.

Il suo richiamo è un sommesso e breve "kek-kek-eke" ed un acuto "ke-i".

In estate frequenta le paludi interne, i laghi ed i fiumi, mentre d'inverno si trova ovunque vi sia uno specchio d'acqua, comprese le coste ed anche in alto mare.

Questa specie nidifica in colonie in prossimità di specchi d'acqua dolce nell'entroterra o lungo le coste; il nido viene costruito da entrambi i sessi sfruttando una concavità del terreno imbottita con sostanze vegetali; nel nido vengono deposte 2-3 uova, di colore bruno-oliva o brunastro e con macchie più scure, incubate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 23-25 giorni; il gabbianello si riproduce una sola volta all'anno.

D'estate si nutre prevalentemente d'insetti, nel resto dell'anno vengono aggiunti alla sua dieta anche piccoli pesci ed invertebrati marini; è in grado di catturare gli insetti in volo.