



Nome comune: Gambecchio

Nome scientifico: *Calidris minuta*

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Classe: Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

Alla foce del fiume Salso è possibile osservare, praticamente quasi tutto l'anno, il più piccolo di tutti i limicoli, il **Gambecchio**; mentre in inverno si è presentato saltuariamente e con pochi esemplari, la sua presenza è diventata regolare nei mesi primaverili ed autunnali, poi, durante i mesi estivi, è scomparso dai primi di giugno ed è ricomparso, abbastanza numeroso, tra la fine di luglio e per tutto il mese di agosto; specie gregaria e molto attiva, di solito lo si vede mentre cammina sui banchi di sabbia, formati alla foce, e lungo le rive fangose del fiume, alla ricerca di cibo insieme ad altri limicoli; i siti di riproduzione sono localizzati nell'Europa nordorientale e nella Siberia settentrionale, mentre in Italia e nelle zone umide del Mediterraneo è di passo; in Italia è svernante nelle zone costiere del Delta del Po, Toscana, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Specie molto piccola (13 cm., 20-40 g.), ha il corpo relativamente tozzo, con collo e coda brevi, il becco diritto, fine e corto e le zampe corte; ha un sopracciglio bianco sulla faccia, le zampe sono nere e quando è in volo mostra, oltre alle barre alari bianche, i lati del groppone e la coda bianchi; in inverno ha il dorso grigio chiaro e scuro ed il ventre bianco, in estate e in autunno presenta il capo, il dorso e i bordi superiori del petto color ruggine contrastato.

La sua voce è un breve "tit-tit", che può trasformarsi in un trillo.

E' una specie che in estate frequenta le paludi nordiche e la tundra, mentre in inverno si sposta sui banchi di fango delle zone umide costiere e delle foci dei fiumi, nelle saline, nelle lagune e negli stagni retrodunali.

Nidifica in una buchetta sul terreno nelle zone paludose e nella tundra in prossimità della costa; nel nido, imbottito di foglie, vengono deposte 4 uova di colore verdastro o fulviccio chiaro e punteggiate di marrone scuro; i piccoli nascono dopo 20-21 giorni; il gambecchio si riproduce una o due volte all'anno e nel caso di una seconda nidificazione ogni genitore si occupa di una covata.

Si nutre di insetti e loro larve durante l'estate e di invertebrati marini durante l'inverno.