



Nome comune: Garzetta

Nome scientifico: Egretta garzetta

Ordine: Ciconiformi

Famiglia: Ardeidi

Classe: Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

www.focesalso.tk

Presente tutto l'anno è la **Garzetta**, un'altra specie di airone che aumenta di numero soprattutto nel periodo delle migrazioni; la si osserva alla foce, spostandosi a volte sin sulla battigia, e lungo le sponde del fiume Salso mentre caccia le prede in due modi differenti: o rimane ferma in mezzo acqua bassa aspettando che qualche preda giunga a portata di becco oppure, smuovendo con le zampe il limo del fondo del fiume, stana le prede e le insegue freneticamente rincorrendole, a lunghe falcate, avanti e indietro; pur essendo una specie gregaria, quando caccia, in genere, non tollera la vicinanza di individui della stessa specie; si riposa lungo le rive del fiume sia allo scoperto sia tra le canne; mentre alcuni individui trascorrono l'inverno nel sud di Francia, Italia e Spagna, altri migrano nelle regioni nordiche e tropicali dell'Africa.

Airone di dimensioni medie (54-65 cm., 400-700 g.), ha un corpo snello e un becco lungo e sottile; il suo piumaggio è bianco candido con il becco nero e le zampe nere con i piedi gialli; nella stagione riproduttiva dalla nuca di entrambi i sessi pende un'elegante ciuffo di piume lunghe e filiformi bianche e sul petto e nella regione scapolare compaiono altre piume lunghe che coprono il dorso fin oltre la coda.

Generalmente silenziosa, quando è disturbata emette un gracchiante "kaark" e, durante la cova, un caratteristico gorgoglio nasale.

Si trova presso le paludi, acquitrini, stagni e lagune con acque basse, ed anche sui greti aperti dei fiumi o in riva al mare

Si riproduce in colonie, assieme alle nitticore, oltre che in luoghi acquitrinosi, anche in zone aperte e asciutte e nei boschi; nel nido, una piattaforma rudimentale costruita su alberi o cespugli (a volte anche nei canneti e nei salicornieti), formato da rametti o giunchi, vengono deposte 3-5 uova, di colore azzurro verdognolo chiaro, covate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 21-25 giorni; questa specie depone una covata annua ed è in grado di riprodursi dopo un anno.

La dieta è costituita da piccoli pesci, anfibi, rettili, piccoli mammiferi, crostacei, molluschi e da molti insetti acquatici che cattura, oltre che camminando nell'acqua bassa o all'agguato, anche sui terreni asciutti.

Fino alla fine del '800, le candide e lunghe piume nuziali, le cosiddette "aigrettes", sono state causa di una caccia spietata verso questa specie, in quanto molto ricercate come ornamento per i cappelli da signora.