Osservatorio avifaunistico alla foce del fiume Salso (Imera Meridionale)

Nome comune: Marzaiola

Nome scientifico: Anas querquedula

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Classe: Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

www.focesalso.it

Alla foce del salso, tra la fine di febbraio e la fine di marzo, durante la migrazione, si può incontrare saltuariamente un'altra anatra di superficie, la **Marzaiola**; la si può osservare mentre cerca il cibo nuotando con la testa sott'acqua senza immergersi mai completamente; è una specie gregaria, ma preferisce raggrupparsi in piccoli gruppi, e di indole abbastanza confidente; nidifica nell'Europa centrale ed orientale, in Svezia e Gran Bretagna e sverna in Africa occidentale, nell'area del Sahel tra il Senegal ed il lago Ciad, spingendosi anche più a sud dell'equatore; nidifica in Italia, raramente e localmente, nella Pianura Padana, mentre più frequentemente sverna nelle regioni meridionali ed in Sicilia.

Di piccole dimensioni (35-41 cm., 250-450 g.), il maschio ha la testa marrone con un'evidente striscia biancastra, a forma di mezzaluna, sopra l'occhio che raggiunge la base della nuca, il becco è nero, il petto bruno screziato, il dorso bruno, il ventre ed il sottocoda sono chiari, le scapolari grigie e ricurve e quando è in volo mostra la parte anteriore dell'ala di un colore grigio azzurro pallido e lo specchio alare verde scuro delimitato da ambo i lati da un barra bianca; la femmina è bruna con macchie chiare ed ha la testa con una stria oculare scura delimitata da striature chiare, il becco è verdastro, la gola biancastra e quando vola mostra le ali colorate di bruno e grigio con lo specchio alare verdastro indistinto; in entrambi gli occhi sono marroni e le zampe grigio bruno.

Il maschio emette una specie di crepitio basso, la femmina un breve "quak".

Preferisce frequentare le paludi d'acqua dolce con acqua bassa e fitta vegetazione, gli stagni acquitrinosi ed i terreni allagati; sosta in mare raramente.

E' la femmina che costruisce il nido al suolo in una depressione, nascondendolo tra l'erba alta ed imbottendolo con materiale vegetale e con il piumino che si strappa dal petto; vi depone 8-11 uova, di colore crema, che cova per 21-23 giorni; la marzaiola nidifica una sola volta all'anno.

Il suo cibo è costituito prevalentemente da piante acquatiche, ma si nutre pure di insetti, molluschi, crostacei, vermi e uova di pesci.