

Nome comune: Moriglione

Nome scientifico: *Aythya ferina*

Ordine: Anseriformi

Famiglia: Anatidi

Classe: Uccelli



(A cura di: Gaetano Bellia)

In autunno inoltrato alla foce del fiume Salso è possibile osservare, in pochi esemplari e sporadicamente, il **moriglione** (*Aythya ferina*) mentre nuota da una riva all'altra del fiume; quest'anatra è un'ottima nuotatrice ed un'esperta tuffatrice ed è difficile vederla camminare sul terreno; quando s'involta sgambetta sulla superficie dell'acqua per poi innalzarsi velocemente in volo con rapidi battiti d'ala; d'indole socievole, spesso si riunisce in grandi stormi; in Europa i siti di nidificazione sono localizzati soprattutto nelle isole britanniche e nelle regioni centro-orientali, mentre quelli di svernamento si trovano lungo le coste del bacino del Mediterraneo; in Italia è una specie svernante, di passo e localmente nidificante.

E' un'anatra di medie dimensioni (46 cm., 700-1100 g.) con un corpo tozzo e rotondo, il collo lungo e robusto, la coda corta e appuntita e le zampe corte che presentano tra le dita una membrana; il maschio ha il petto e il sottocoda di colore nero, il dorso grigio argentato, i fianchi grigio chiaro e la testa bruno ruggine con l'occhio rosso; la femmina è uniformemente più chiara con la testa ed il petto di colore marrone, inoltre presenta delle macchie chiare intorno al becco e agli occhi, quest'ultimi sono di colore marrone; entrambi i sessi quando sono in volo mostrano sulle ali una banda alare chiara poco evidente.

Solitamente è silenzioso; a volte emette profondi brontolii e sibili.

Quest'anatra durante la stagione estiva frequenta laghi e paludi con canneti; in inverno preferisce sostare in acque più aperte e occasionalmente anche in mare.

Il nido, formato da un intreccio denso di vegetali ben nascosto in mezzo al canneto, viene costruito dalla femmina a terra, anche vicino all'acqua, essa provvede anche a foderarlo con il piumino che si strappa dal corpo; nel nido vengono deposte 8-10 uova, di colore verdastro chiaro, che vengono covate soltanto dalla femmina; i piccoli nascono dopo 25 giorni; il moriglione si riproduce una sola volta all'anno.

Si nutre di piante acquatiche; fanno parte della sua dieta anche larve, piccoli molluschi e crostacei che cattura tuffandosi a diversi metri di profondità percorrendo lunghi tratti in immersione.