Osservatorio avifaunistico alla foce del fiume Salso (Imera Meridionale)

Nome comune: Pantana

Nome scientifico: Tringa nebularia

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Classe: Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

www.focesalso.it

Un altro visitatore regolare della foce del fiume Salso, ma con pochi esemplari, è la **Pantana**, presente sia durante le migrazioni sia nei freddi mesi invernali; specie molto timida e nervosa, la si vede mentre si nutre muovendo il becco nell'acqua bassa con energia; nidifica nell'Europa settentrionale, dalla Scandinavia fino alle coste del Pacifico, e sverna nelle stesse aree del totano moro e della pettegola; in Italia è un visitatore invernale e si ferma anche durante le migrazioni.

Limicolo di medie dimensioni (30-31 cm., 140-270 g.), possiede un corpo robusto e allungato, un collo lungo, il becco, spesso alla base e con la punta smussata, è lungo, sottile e leggermente inclinato verso l'alto e le zampe sono molto lunghe ma ben proporzionate; presenta il dorso di colore grigiastro, il ventre è bianco, il becco verdastro con la punta nera, gli occhi sono scuri e contornati da un anello biancastro poco evidente, le zampe di colore grigio-verdastro e quando è in volo mostra il groppone ed un triangolo sul dorso di colore bianco, come nella pettegola, ma molto più esteso e appuntito; d'estate la testa ed il petto presentano striature e macchie nere, mentre in autunno ed inverno sono più chiari.

Quando è in volo emette un forte "tia-tia-tia", mentre il suo grido d'allarme è un sonoro, calmo ed energico "tiu-i" ripetuto regolarmente; se è disturbata emette anche un corto ed eccitato "cip".

In estate vive nelle brughiere vicino alle foreste, mentre d'inverno frequenta le paludi, le saline, le piccole insenature e le zone umide costiere.

La costruzione del nido è opera della femmina che sfrutta una piccola depressione del terreno vicino all'acqua; nel nido, imbottito con foglie secche ed erba, vengono deposte 4 uova, di colore crema o bruno macchiate leggermente con segni rossicci, incubate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 21-24 giorni; la pantana si riproduce soltanto una volta all'anno.

Il suo cibo è costituito da invertebrati.