



Nome comune: Piovanello pancianera

Nome scientifico: *Calidris alpina*

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Classe: Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

Altro limicolo che visita regolarmente tutto l'anno, eccetto nel periodo riproduttivo, la foce del fiume Salso è il **Piovanello pancianera** (*Calidris alpina*); numeroso soprattutto durante le migrazioni, a fine marzo e a fine settembre, scompare dalla metà di aprile alla fine luglio, in inverno la sua presenza diventa più rara, mentre nel resto dei mesi è possibile vederlo più o meno costantemente e, comunque, in pochi esemplari; spesso lo si osserva, in compagnia di altre specie affini, mentre batte in lungo e in largo le sponde fangose del fiume alla ricerca di cibo; è una specie nidificante nelle aree estreme dell'Europa settentrionale; in Italia è un visitatore di passo e svernante.

Uccello di dimensioni variabili, comunque piccole (18 cm., 40-50 g.), ha un corpo tozzo ed un becco abbastanza lungo, che in alcuni esemplari è diritto, in altri leggermente rivolto all'ingiù; come altri limicoli, quando è in volo mostra le barre alari bianche e due chiazze bianche ai lati della coda, attraversata, longitudinalmente fino al dorso, da una striscia scura; in autunno presenta il dorso grigio, il petto striato ed il ventre bianco; in estate il dorso diventa rossiccio, le striature sul petto più marcate e il ventre si colora di nero.

La voce è un alto e stridulo "siiiip", spesso ripetuto a formare un trillo.

Questa specie d'estate frequenta le brughiere e le paludi salmastre, mentre in inverno si sposta, anche in gruppi numerosi, sulle spiagge sabbiose, sugli arenili, nelle foci dei fiumi e sui banchi di fango delle paludi dell'interno.

E' la femmina che costruisce il nido, una coppetta foderata di vegetali secchi e muschio, in una depressione del suolo, tra i ciuffi d'erba o il brugo; qui vi depone 4 uova, di colore crema, fulvicce o verdastre, punteggiate e macchiate di marrone scuro, che vengono incubate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 21-22 giorni; il piovanello pancianera nidifica una sola volta all'anno.

Si nutre di invertebrati e, nella stagione riproduttiva, soprattutto di insetti.