



Nome comune: Piro piro boschereccio

Nome scientifico: *Tringa glareola*

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Scolopacidi

Classe: Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

Nel corso della migrazione autunnale è possibile osservare il **piro piro boschereccio** (*Tringa glareola*) mentre si riposa lungo le rive della foce del fiume Salso in prossimità della vegetazione acquatica; uccello molto nervoso e vocifero, si mescola spesso con altre specie di uccelli anche di grosse dimensioni; è una specie diffusa lungo la zona settentrionale dell'Eurasia; in Italia è presente nei periodi di doppio passo, saltuariamente e localmente d'estate tende a sostare lungo i fiumi e risulta svernare solo occasionalmente.

Uccello limicolo di media taglia (20 cm., 50-90 g.), presenta un corpo aggraziato con zampe lunghe, il collo è snello, la testa piccola è provvista di un becco lungo ed esile; ha un evidente sopracciglio bianco che si dilunga quasi fino alla nuca, il dorso, di colore marrone, si presenta chiazzato di macchioline chiare e strie nerastre, il collo è biancastro con striature marrone, le parti inferiori sono chiare e le zampe di colore giallastro; quando è in volo mostra sotto le ali una colorazione chiara, la coda ed il groppone sono bianchi, le ali sono abbastanza snelle e presentano un bordo bianco, le zampe sporgono dalla coda che termina con 4-5 barre scure.

Emette di continuo un richiamo rapido ed acuto, "ciff-if-if"; il canto è un trillo discendente.

Specie gregaria e schiva, durante l'estate frequenta le paludi e gli acquitrini con acqua poco profonda, mentre in inverno è possibile osservarlo presso laghi, fiumi e altre zone, soprattutto con acqua dolce e vegetazione; di solito non gradiscono frequentare le acque salate e le coste marine.

Il piro piro boschereccio costruisce il nido a terra in una depressione, rivestita con vegetali, nelle zone aperte ed umide delle foreste nordiche e lungo le coste; a volte può utilizzare vecchi nidi di altri uccelli dislocati sopra gli alberi; nel nido vengono deposte 4 uova, raramente 3, di colore verdastro con punteggiature e macchie di colore marrone scuro, covate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 22-23 giorni; questa specie si riproduce una sola volta all'anno.

Il suo cibo è costituito da invertebrati, soprattutto insetti, molluschi e crostacei, che cattura nelle acque ricche di vegetazione immergendosi fino al ventre.