



Nome comune: Sterna maggiore

Nome scientifico: Sterna caspia

Ordine: Caradriformi

Famiglia: Sternidi

Classe: Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

www.focesalso.it

Una sterna rara che è possibile vedere alla foce del fiume Salso, sul finire dell'estate ed in pochi esemplari, è la **Sterna maggiore**; la si osserva mentre sorvola la foce e si riposa lungo le sponde del fiume; ha un volo potente e si tuffa come le sue consimili; i siti di nidificazione sono localizzati sulle coste del Baltico, del Mar Nero e della Tunisia e sverna in Africa.

Uccello enorme (52-53 cm., 550-750 g.), grande quasi come un gabbiano reale, possiede una coda corta e ampiamente forcuta ed un becco grande e massiccio; presenta un piumaggio bianco, il becco è di colore rosso arancione vivo, le zampe sono nere, il dorso e le ali grigie e quando è in volo mostra la punta delle ali scura di sotto; in estate sul capo presenta un vasto cappuccio nero, mentre in inverno questo diventa screziato di bianco.

Il suo richiamo è un basso "caark".

Solitamente si trova lungo le coste sabbiose o ghiaiose, ma può spostarsi anche nelle zone interne lungo i corsi d'acqua.

Nidifica in colonie in una piccola buca scavata tra la ghiaia; nel nido nudo vengono deposte 2-3 uova, di colore crema chiaro con macchie fini di colore marrone e grigio, covate da entrambi i genitori; i piccoli nascono dopo 20-22 giorni; questa specie si riproduce soltanto una volta all'anno.

La sua dieta è costituita prevalentemente da pesci.