



Nome comune: Tuffetto

Nome scientifico: *Tachybaptus ruficollis*

Ordine: Podicipediformi

Famiglia: Podicipedi

Classe: Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

www.focesalso.it

Nei mesi invernali, alla foce del Salso, è possibile osservare occasionalmente il **Tuffetto**, il più piccolo degli svassi; ciò è un fatto del tutto inconsueto dato che quest'uccello preferisce le acque dolci ferme o debolmente correnti; soltanto durante le migrazioni, pur essendo una specie sostanzialmente sedentaria, questi uccelli si possono trovare facilmente anche nelle acque salmastre in vicinanza delle coste; assai timido e diffidente, rimane quasi sempre nascosto in mezzo alla vegetazione acquatica ripariale; ogni tanto si immerge nell'acqua con un tuffo rapidissimo riemergendo a qualche distanza dal punto d'immersione; è molto abile nel nuoto anche in profondità, dove va alla ricerca di piccoli pesci ed insetti acquatici, ma non nel volo, tant'è vero che se inseguiti preferiscono tuffarsi anziché fuggire a volo; curiosamente, quando piove, per non "bagnarsi" si ripara tuffandosi sott'acqua.

Di piccole dimensioni (23-27 cm., 100-200 g.), possiede un corpo compatto e idrodinamico, un becco corto e appuntito, un collo robusto e piuttosto breve, una coda corta e le zampe provviste di dita lobate; d'inverno è color grigio scuro, con il ventre bianco; d'estate ha il dorso molto scuro, con una parte del capo e del collo castano rossiccio, mentre il ventre si presenta nerastro con riflessi argentati; all'altezza della gola è bruno scuro e caratteristica è la zona gialla alla base del becco nero.

Il suo richiamo è un trillo stridulo e talvolta un ripetuto "uit uit".

Costruisce un grossolano nido galleggiante, fatto d'erba e di canne, grande come un piatto, nel quale vengono deposte in media 4-6 uova biancastre che diventano scure con il procedere della cova di cui si fanno carico entrambi i genitori; se durante l'incubazione uno dei genitori deve lasciare momentaneamente il nido ricopre le uova con la vegetazione a scopo mimetico; durante la stagione riproduttiva può nidificare una seconda volta, raramente una terza; i piccoli nascono dopo una ventina di giorni.

Si nutre di insetti, larve, piccoli crostacei, molluschi, girini e piccoli pesci (soprattutto in inverno).

E' interessante notare come la presenza di svassi in uno specchio d'acqua sia indizio di nullo o scarso inquinamento e per tale motivo questi uccelli vengono considerati indicatori biologici.