



**Nome comune:** Voltapietre

**Nome scientifico:** *Arenaria interpres*

**Ordine:** Caradriformi

**Famiglia:** Scolopacidi

**Classe:** Uccelli

(A cura di: Gaetano Bellia)

L'ultima specie di questa numerosa famiglia che viene a visitare, in inverno e durante le migrazioni, saltuariamente e con pochi esemplari, la foce del fiume Salso, è il **Voltapietre**; specie molto confidente, lo si vede camminare a scatti sulla spiaggia e smuovere con il becco tutto ciò che incontra alla ricerca di cibo; i siti di nidificazione europei sono localizzati lungo le coste della Scandinavia e della Danimarca, fin nelle regioni a nord del Baltico; sverna in Europa occidentale ed in Africa; frequenta l'Italia durante il periodo del doppio passo, ma in modo irregolare, e durante l'inverno.

Uccello di piccole dimensioni (22-24 cm., 80-110 g.), possiede un corpo robusto ed elegante, il becco è corto, massiccio, appuntito e leggermente rivolto verso l'alto e le zampe sono corte; ha il becco nero, le zampe di colore arancione e quando è in volo mostra un piumaggio bianco, su dorso, ali e coda, e nero; in inverno ha un piumaggio bruno opaco con il petto nero ed il ventre bianco; in estate il dorso si colora di un ruggine carico con bande nere, mentre la testa ed il collo si colorano con delle macchie nere sullo sfondo bianco.

Il suo richiamo è un sonoro cinguettio, un "tok-e-tok" leggermente metallico; quando è disturbato emette una rapida serie di note.

Vive nella tundra artica, lungo le coste, soprattutto con spiagge sassose e ricoperte di alghe, nelle foci dei fiumi e nelle zone umide costiere, soprattutto in inverno.

Il nido viene costruito dalla femmina sfruttando una buca poco profonda del terreno nelle zone aperte in prossimità delle coste marine; nel nido, non sempre imbottito, vi depone e cova, talvolta aiutata dal maschio, 4 uova di colore oliva o verdine con macchie bruno nerastre; i piccoli nascono dopo 21-24 giorni; il voltapietre si riproduce soltanto una volta all'anno e raggiunge la maturità sessuale all'età di due anni.

Mentre in inverno la sua dieta è costituita da insetti, vermi e altri piccoli animali marini, d'estate di solito si nutre soltanto d'insetti.